

醫心方卷第三

下



醫心方卷第三

從五位下行賦博士兼丹波介丹波宿禰康賴撰

風病證候第一

治一切風病方第二

治偏風方第三

治半身風方第四

治風症方第五

治柔風方第六

治頭風方第七

治中風口禁方第八

治中風口喎方第九

治中風舌強方第十

治中風失音方第十一

治中風聲嘶方第十二

治卒聲喑方第十三

治中風驚悸方第十四

治中風身不仁方第十五

治中風四肢不屈申方第十五

治中風身如虫行方第十七

治中風隱軀方第十八

治中風隱軀生瘡方第十九

治中風癰病方第二十

治中風言語錯亂方第二十一

治中風癰病方第二十二

治中風狂病方第二十三

治虛熱方第二十四

治客熱方第二十五

風病證候第一

黃帝大素經云風者百病之長也至其變化為他



治中風言語錯亂方第廿一

治中風痙病方第廿二

治中風狂病第廿三

治虛契方第廿四

治客契方第廿五

風病證候第一

黃帝大素經云風者百病之長也至其變化為他

病也無常方也楊上善云百病曰風而生變為萬病又云人之生也感風氣而生其為病也曰風氣為病又云九宮

經曰冬至之日太一至坎宮天心應之以風雨素風從太一所居鄉未向中宮名為實風長養萬物若風從南方來向中宮為衝後未虛正

成傷人者也

素問經云千病萬病無病非風

醫門方云凡人性稟五行曰風氣而生長風氣雅

能長物還能為害傷人如水浮舟亦能覆舟

源論云中風者風氣中於人也風是四時之氣

分布八方主長養萬物從其鄉來者而人少死病

不從其鄉來者人多死病其為病也藏於皮膚之

間內不得通外不得泄其人經脈行於五藏者各隨

藏府而生病焉

心中風但得濡卧不得傾側汗出若膚赤汗流者可

治急灸心俞百壯若膚或青或白或黃或黑此是心

壞為水面目亭之時悚動皆不可復治五六日而

而死肝中風但踞坐不得仰頭若繞兩目連額上色

微有青膚色青面黃可治急灸肝俞百壯若大青黑



心中風但得僵卧不得傾側汗出若膚赤汗流者可

治急灸心俞百壯若膚或青或白或黃或黑此是心

壞為水面目亭之時悚動皆不可復治五六日而

而死肝中風但踞坐不得仰頭若繞兩目連額上色

微有青膚色青面黃可治急灸肝俞百壯若大青黑

面一黃一白者是肝已傷不可復治數日而死

脾中風踞而腹滿軟通黃吐酸汗出者可治急灸

脾俞百壯若手足青者不可復治也

腎中風踞而腰痛視脇左右未有黃色如餅糲大

者可治急灸腎俞百壯若齒黃赤鬚髮直面上

色者不可復治也

肺中風僵卧而脅滿短氣胃悶汗出視目下鼻上

下兩邊下行至口色白可治色急灸肺俞百壯若色

黃為肺已傷化為血不可復治其人當安臥或

自拈衣如此數日而死

小品方云說日風者四時五行之氣也分布八方順

十二月於三百六十日各以時從其氣來為正風在天

地為五行在人為五藏之氣也万物生成之所順非

毒厲之氣也人當舉之過不勝其氣乃病之自

惟病然有自老者也加治則易食愈其風非時至

者則為毒風也不治則不能自差焉今則列其證



十二月終三百六十日各以時從其氣來為正風在天  
地為五行在人為五藏之氣也萬物生成之所順非  
毒厲之氣也人當舉之過不勝其氣乃病之可  
推病然有自老者也イニ加治則易食愈其風非時至  
者則為毒風也不治則不能自養焉イニ今則列其證  
如左

春甲木東方清風傷之者為肝風入頭頸肝頸  
愈中為病多汗惡風喜怒兩脇痛惡血在內飲食  
不下支節時腫顏色蒼ハニ泄カキ益イニ乾イニ仇イニ頤イニ

夏丙丁火南方湯風傷之者為心風入胃脇府藏  
心愈中為病多汗惡風焦悍イニ苦悲イニ顏色赤潤イニ泄イニ

清穀仲夏戊己土同南方陽風傷之者為脾風  
入背脊脾愈中為病多汗惡風肌肉痛身體急

瘠イニ四肢不欲動不嗜食顏色黃イニ毒因イニ人虛實之  
變陽氣有餘陰氣不足者則內外生熱在中者

令人喜イニ飢若陽氣不足陰氣有餘者則內如有寒  
從中出腸鳴而痛秋庚辛金西方涼風傷之者

為肺風入肩背肺愈中為病多汗惡風寒熱  
欬動肩背顏色白イニ濡然イニ病瘵イニ晝イニ老イニ夕イニ甚イニ

冬壬癸水北方寒風傷之者為腎風入腰股四肢  
腎愈中為病多汗惡風腰脊肩背頸項痛不

又作鼻  
巨鳩及  
寒鼻塞  
也  
泄私列餘  
制三又癰  
歌也  
之氣

蓋  
說文







八日合夏至合卅五日風名同

西南方坤之氣立秋王為涼風一名謀風王卅五日

西方乾之氣秋分王為闔闔風一名對風王卅五日

西北方乾之氣立冬王為不周之風一名折風王卅五日

北方坎之氣冬至王為廣莫風一名大剛風王卅五日

石八方之風各從其歸來主長養万物人民少死病也

又云八方風不從其歸來而從衝後來者為虛邪賊害

万物則人民多死病也故聖人說避邪如避矢也邪者

風也令人壽夭多病是不知避邪也為病證候如左

凶風之氣內舍大腸中外在脇胛骨下四支節解中

書本遺其病證今無也

嬰兒風為病令人筋筋濕其氣內舍肝中外在筋中

弱風為病令人體重其氣內舍胃中外在肉中

大弱風為病令人發熱其氣內舍心中外在脉中

謀風為病令人弱四支緩弱也其氣內舍脾中外在

肌中

剛風為病令人燥者枯燥瘦瘠也其氣內舍肺中

折風為病則因人脉絕時而泄利脉閉時則結不通

喜暴死也其氣內舍小腹中外在右手太陽中

大對風為病令人寒者患令不能自溫也其氣內

作燥  
先通又



肌中

作燥  
先道及  
乾

剛風為病令人燥  
 者枯燥瘦瘠也  
 其氣內舍肺中  
 外在皮中

外在皮中

折風為病則因人脈絕時而泄利元脈閉時則結不通元  
喜暴死也元其氣內舍小腹中外在右手大陽中元

大。對。風。為。病。令。人。寒。之。者。患。冷。不。能。自。溫。也。其。氣。內。

又作呂字林

腎中外在骨中脊背筋中也

右八風從其衝後來者為病如此

又作摯月亦  
姓太嶽為  
禹心呂之  
呂故封為  
呂侯

又云新食竟取風為胃風其狀惡風頸多汗羣下塞不通食飲不下脹滿也形瘦腹大失衣則填滿食寒則

洞泄

目眩取風為漏風其狀惡風多汗少氣口乾渴近衣則

身熱如火燒臨食則汗流如雨骨節解惰不欲聞營

新沐浴竟取風為首風其狀惡風面多頭<sub>汗</sub>痛

新  
房  
室  
竟  
取  
風  
為  
泄  
風  
其  
狀  
惡  
風  
汗  
流  
沾  
衣

勞風之為病。喜在肺。使人強上惡風。寒戰目眩。謬

淫タ出ト候之三日中及五日中不精明者是也七八日

則效有清黃膿涕如彈丸大從口鼻中出為善也

若不出則傷肺  
今茶大素經  
強上好作也

又玄風者其氣毒行而穀變在人肌膚中內不得

泄外不得散。曰人動靜乃變其性。其證如左。

有風過寒河  
寒下下  
遇熱則凡  
均荷化  
寒熱



淫出候之三日中及五日中不精明者是也七八日  
則微有清黃膿涕如彈丸大從口鼻中出為善也

若不出則傷肺今案大素經  
強上好作也

又云風者其氣毒行而穀變在人肌膚中內不得

泄外不得散目人動靜乃變其性其證如左

有風遇寒則食不下遇熱則肌肉消寒熱

有風遇陽盛則不得汗遇陰盛則汗自出

肥人有風肌肉厚則難泄毒為熱中目黃

瘦人有風肌肉薄則恒外行身中寒目淚出

有風遇實則湊理開則內伏令人熱悶若目熱食

汗欲通湊理得開其風自出則覺肉中如針刺步行

運方欲汗之如此

有風遇虛湊理開則外出淒然如寒然覺身中有

如水淋時如竹管吹處

脉驗方云風者天地山川之氣也所發近遠有焉

其一是天地八方四時五行之氣為遠風也其風

騷騷鼓振者此則山川間氣為近風耳騷由鼓肩動

於手握之間便能致風之能動物之能病人而非天

地之氣也

又云經言諸取風者非是時行承茸之風之非山川

鼓振之風也此人間淫巷門戶窓牖之淫氣耳天



健聰颺鼓振者此則山川間氣為逆風耳言由鼓肩動  
於手握之間便能致風之能動物之能病人而斐  
地之氣也

又云經言諸取風者非是時行永草之風之非山川  
鼓振之風也此人間逆巷門戶窓牖之逆氣耳天

無風之日其恒有逆風人長居其間積日月此能虛  
人肌理入人百脉政人五藏六府則致病焉復有野  
間廣澤都亭咸逆風之不可居卧也復有賦性恒  
使人扇之之能生病也小輕於逆水中耳古今有  
身驗其事者甚眾今略記其三條於後章

貼貼王補天叶古雒陽市有一上貼家家取要貨賣信集但貨

周年中必得病致死遂成空廢無復生者有一七兒常  
出市乞每歲輒現貨主非復舊人七兒問知多死疾  
源一品便者貼中准見貨主坐家背約一柱有一虫  
食穴故家有風貫過如箴頭大正射生人項即是  
風府處七兒計疾源一品人坐所當皆是其項所  
對死當由此便詣市官求貼坐之卧寒此孔遂元復  
病安全永保其富此其驗也

金難經十二經皆有今有一人家作北向聽事閣在南架下主人四月中溫  
病逐涼開闢正首閣卧乃訴脉之作五六過來去  
後其作一過來至閣上注不進寸口而去或作五六過  
來後而作一過來至閣上注不進寸口而去或作五六過

針灸經  
手有內  
關外關  
華佗脉  
訣云寸尺  
位各八分  
開上修三  
寸九分  
脈動也  
手大陰之  
脈動也



對死當由此便詣市官求貼坐之卧寒此孔遂元復

病安全永保其富此其驗也

全難經  
十二經時有  
動脈獨取  
寸口以候五  
藏六府  
死生之法  
又云寸口者  
脈之大會  
手太陰之  
脈動也  
又云從關  
至尺內  
候之所  
治也

今有一人家作北向聽事閣在南架下主人四月中溫

針灸經  
手有內  
關外關  
訣云寸尺

病逐涼開闢心首閣卧乃訴脈之作五六過來去

位各八分  
開上修三  
寸九分

後其作一過來至開上注不進寸口而去或作五六過

來後而作一過停住寸口不昂去脈既如此意欲久訴也

者其變通其家內人應從閣內經過便暫閉閣之開

之後脈便不復住開上及停寸口中於是仍令其

且閉閣久訴脈者則不覺復停住開上寸口也試復

開閣少時風來甚遙脈還復停住開上寸口中仍復

還閉閣即復調病人愛煩永不肯還庸中避風而

脈令湯以除溫遂病瘡絕而死矣是以明知遙氣之

風不可久當也

有一家作三間屋開中央一間南北對作都戶安一

床當中央夫婦便坐其中監者事經一年許夫婦

甘中風口禁死也

治一切風病方第二

蒼婆方治一切風病日月殷方

秦膠八分獨活八分二米切搗節為散以酒服一方寸

上日二還遂四時之四季作服之春散夏湯秋丸冬

酒四季煎膏

又云治男女老幼一切風病之狀頭重痛良劑



治一切風病方第二

耆婆方治一切風病日月散方

秦膠ハカ八分獨活ハカ八分二米切ミヤ搗節ミヤ為散以酒服セムコト方寸

上自二還遂四時之四季作服之春散夏湯秋冬

酒四季煎膏

又云治男女老小一切風病之風之狀頭重痛眼闇

四肢沉重不舉不隨頭悶心悶煩躁手足疼痛腫

氣不能多食嗔怒憂思健忘多夢悟悟之只欲

睡卧癩起面目失色房事轉弱漸自瘦不能勞動

之方病即發万病並主之方

人參シム白鮮ハカ防風ハカ防已ハカ芍藥ハカ秦膠ハカ獨活ハカ

右七味切以水一斗二升者取二升分為六服

一方以水六升者取一升半分為三服之相去

十里外六服者相去廿里令了助無相惡宜久

服之延年益智聰慧湯服訖散服方寸匕

酒服酒三斗漬之一宿少飲之煎服少服

之九服蜜和為丸之如大豆一服十四丸並用

酒服之其外兩一依前法恒逐四時常令服使

人不生方病

范汪方治風有十品一日入頭之重耳塞鼻仇目視

眩二日入肥膚皮隱軫發瘡生瘡三日入筋之急



之九服蜜和為丸如大豆一服十四丸並用  
酒服之其分兩一依前法恒逐四時常令服使  
人不生方病

范汪方治風有十品一日入頭二重耳塞鼻仇目視  
眩三日入肥膚皮隱軀發瘡生瘡三日入筋之急  
縮痛四日入脉動上下無常五日入骨齒齠  
疼酸不能久立六日入心堆悻悻怒自悲自毒七  
日入肺令人欬逆恒氣晝夜刻八日入肝頭眩

目視不明九日入脾令人腸鳴舌上創兩脇不心滿  
堅閉不利十日入腎令人身中雷鳴甚則膿  
出治之防風丸方

芎藭四分 蜀椒三分 一方 貝母三分 防風二分  
一方 當歸二分 一方 白芷二分 一方 梔子一分 一方  
木二分 一方 凡八物治下節丸以蜜如彈丸  
頻服一丸先食禁食生菓猪肉生菜服

藥十三日風當出去當有熱象隨以水洗之矣  
良 今案麻驗方云如梧子以好酒服  
三九日二不知稍增可至十九

小品方小續命湯治卒中風欲死身體緩急口目  
不正舌強不能語奄奄惚惚精神悶亂諸風服  
之皆驗不令人虛方

甘草一兩 麻黃一兩 防風一兩半 防己兩 大桑兩



良 今案 厥驗方云如梧子以好酒服  
三九日二不知稍增可至十九

小品方小續命湯治卒中風欲死身體緩急口目  
不正舌強不能語奄々惚々精神悶亂諸風脹  
之皆驗不令人虛方

甘草一兩麻黃一兩 防風一兩半 附子一兩  
黃芩一兩桂心一兩 附子一兩 芍藥一兩 芍藥一兩 芍藥一兩  
生薑五兩

石十一物以水九升煮取三升分三服甚良不寒更

合三四劑必佳取汗隨人風輕重虛實也有人脚

弱服此方至六七劑得差有風痲家天陰節

變輒合之可以防瘡瘕也

挫要方云療風病多逢有失音不得語精神如醉

人手足俱不得運用者有能言語手足不廢精神

昏恍不能對人者有不能言語手足精神昏亂有

言語手足精神俱不異乎常而發作有時每發昂

狂言語高聲大叫得定之後都不自醒者有諸事

不異尋常發作有時每發則狂走叫喚者有諸事

不異尋常發作有時每發昂作牛羊禽獸聲

醒後都不自覺者有諸事不異尋常發作有時

每發昂頭旋目眩頭痛眼花心悶輒吐經久定方

者有諸事不異尋常發作有時每發輒發其頭



不異尋常發作オモルコト有時每發則狂走クハシ叫喚者セウ有諸事

不異尋常發作有時每發昂作牛羊禽獸聲

醒後都不自覺者有諸事不異尋常發作有時

每發昂頭旋目眩頭痛眼花心悶輒生經久定方

者有諸事不異尋常發作有時每發輒發熱頭

痛流汗不自勝舉者此等諸風形假雖別尋其源也

俱失於養本氣既羸偏有所損或以男女或以飲食或

以思慮或以勞役既極於事能不敗乎常量已所歸而

捨割之靜思息事兼助以藥物之有可復之理風有緣

飲酒過草不能言語手足不遂精神昏恍得病經

一兩日且依後生葛根等湯服之

生葛根ナツキタケ一挺長一尺徑三寸生薑シヤウ二大合竹瀝タケノサヤ二大升

如不可得宜物モシ薊竹根キヌ大一升切以水一大斗スルキヒニ緩火煎

取二大升以代竹瀝如竹瀝根不可得モ以薊竹葉

細切一大升以水二大升如上法煎取二大升以代ヨク瀝

如元竹葉宜細切モ束ユタ一大斗以水一大斗煎取

二大升代之

右先取生葛根淨洗刷便ギ搗碎且宜シタ取汁令

盡シ訖又搗シ昂竹瀝シ搗シ取汁シ盡シ為度用

和生薑汁シ綿瀝ハハ之細シ暖服之不限迴數及食

服之如經七日以後服附子等湯之前食後如覺腹內轉作聲又似痛即以此食後溫



二大升代之

右先取生葛根淨洗刷便槁碎且宜近取汁令  
盡訖訖又搗昂竹漚漚搗近取汁盡為度用

和生薑汁綿漚之細暖服之不限迴數及食  
前食後如覺腹內轉作聲又似痛即以此食後溫  
服之如經七日以後服附子等湯之

雜酒方治一切風病獨活酒方

獨活五兩黑大豆三升無音凡二物以酒一斗漬之五

日始服日三多少任意但大豆者漬之二日出去

酥驗方云帝釋六時服呵梨勒丸方

右呵梨勒者具五種味辛酸苦鹹甘脹元忌治

一切病大消食益壽補益令人有威德延年

是名家上仙藥療廿八種風痺塊大便不通體

格乾燥面及通身黃者痔赤目下部疼痛

久壯熱一切心痛頭旋悶耳痛重聽有身體

癰疽積年不瘳痢不思食淡冷有胃中

歌味膚色白于燥小便稠數腸脹瘕氣初

患水病者療腎破無元顏色黃腸內虫脚氣

上吐元力支節疼痛血脉不通心上似有物

勇健忘心迷如是等皆悉奏除也

呵梨勒皮八分檳榔人八分人參三分橘皮六分

伏苓四分芒消四分獨春三分豉四分



患水病者療腎破無元顏色黃腸內虫脚氣  
上吐元力支節疼痛血脉不通心上似有物  
勇健忘心迷如是等皆悉是除也

可梨勒皮八分檳榔人八分人參三分橘皮六分

伏苓四分芒消四分獨活三分豉四分

大黃八分干薑十二分桃人八分牽牛子

十三兩桂心八分

凡十三味受咀下篩以蜜丸如梧子服廿九食  
前以溫酒若薄粥汁服平且得下利良

### 治偏風方第三

病源論云偏風者風邪偏客於身一邊也人體有偏

虛者風邪乘虛而傷之故為偏風也其狀或不

知痛癢或緩或緩或緩或痺痛是也

千年經日一邊偏風可鼻不通午脚不隨者取胡

麻油煎青木香咒三七遍摩拭身上永差

### 龍門方治卒偏風方

以草火灸令遍身汗流三差

又方大麻子搗以酒和絞取汁溫服發差三

佳

又方黑胡麻搗末酒漬服七日後差驗

撻要方療偏風服之三日內能起方



以草火灸令遍身汗流三寒

又方大麻子搗以酒和絞取汁溫服發並三佳

又方黑胡麻搗末酒漬服七日後暴驗

撻要方療偏風脹之三日內能起方

羌活獨活一名也

羌活三兩桂心二兩于薑二兩附子二顆炮

右以水一升半煮取半大升分二服

治半風方第四

病源論云風半身不隨者脾胃氣弱而氣偏虛為風邪所乘故也

千金方治大風半身不隨方

羌活氣鼠壤土氣袋盛熨之鼠

又方蜚沙カヒコウソ熟ユク蒸ムシ作練袋三枚各灸七升熟盛一袋著患處如冷即取餘袋一依前法數換之

又方灸風池肩髃曲池陽陵泉臣虛下廉

治風症方第五

病源論云風症者口禁不開背強而直如莢癰之

狀其重者耳中策々痛卒然身體症直者死也

由邪傷於大陽經復遇寒濕則發症也

勅驗方治風症身強方

蒸大豆慰之千金方又方蒸鼠壤土熨之取汗



病源論云風症者口禁不開背強而直如莢癰之

狀其重者耳中榮痛卒然身體症直者死也

由邪傷於大陽經後遇寒濕則發症也

効驗方治風症身強方

煮大豆慰之千金方又方豕鼠壤土熨之取汗

新脈方治風症身強方

薄荷三枚以水六升煮取二升分二服

葛氏方若身直不得屈伸及痠者方

取槐皮黃白者以酒若水六升煮得二升去滓

稍服

蘇敬本草注治風症方

銅屑今極熱投酒中服五合日三

又方鐵屑炒使極熱投酒中飲酒良

本草替穀治風症方

煮蠶沙熨之

治柔風方第六

病源論云柔風者血氣俱虛風邪並入在於陽則皮

膚緩在於陰則腹裏急而支不能自收震急不得

休息也

小品方治中柔風身體疼痛四肢緩弱欲作不隨方

本草云 羌活三兩桂枝三兩生薑六兩干地黄三兩



治風方第七

病源論云柔風者血氣俱虛風邪並入カセニナシ在於陽則皮

膚緩シ在於陰則腹裏急カセニナシ血氣不能自收カセニナシ震急不得

作息也カセニナシ

小品方治中柔風身體疼痛四支緩弱カセニナシ欲作不隨方

本草云桂枝湯

羌活三兩桂肉三兩生薑六兩干地黄三兩カセニナシ

葛根三兩カセニナシ芍藥三兩麻黃二兩カセニナシ甘草二兩カセニナシ

本方桂心

凡八物以清酒三升水五升煮取三升溫服五合日

三カセニナシ今案千金方云酒二升水八升大驗

葛氏方治中緩風四支不收者方

豉三升水九升煮取三升分三服日二作亦可カセニナシ清漬

黃欬

治頭風方第七

病源論云風頭眩者由血氣虛風邪入於腦而引目

系故也カセニナシ

養生方云飢食作卧久成氣病頭風

又云飢食沐浴作頭風

耆婆方治人一切風氣風眩病三光散方

秦膠十二分カセニナシ伏神十二分カセニナシ獨活八分カセニナシ

三味切搗篩為散以酒服方寸匕日三依日月法

又云治人風氣風眩頭面病四時散方

秦膠獨活伏神薯蕷



又云風食津液作頸風

耆婆方治人一切風氣風眩病三光散方

秦膠十二分 伏神十二分 獨活八分

三味切搗篩為散以酒服方寸匕日三依日月法

又云治人風氣風眩頭面病四時散方

秦膠獨活伏神署預

四味切搗篩為散以酒服一方寸匕日二依日月法

春各四分 夏各二分 秋各八分 冬各十二分

又云治人風氣風眩頭面風病五藏散方

秦膠獨活伏神署預山茱萸八兩依四時散五味

五味切搗篩為散以酒服一方寸匕日二依日月散法

又云治人風氣風眩頭面風病中風病五時散方

秦膠獨活伏神署預山茱萸本依時散

兩六味切搗篩為散以酒服一方寸匕日二依月

散法

又云治人風氣風眩頭中風病中風脚弱風濕痺

病七星散方

秦膠獨活伏神署預天雄山茱萸

七味切搗篩為散以酒服方寸匕日二依四時散法

又云治人風氣風眩頭面風中風濕痺脚弱房少精

八風散方

秦膠獨活伏神署預山茱萸本天雄



痼疾

秦膠獨治伏神暑預天雄山茱萸高本

七味切搗篩為散以酒服方寸匕日二服四時散法

又云治人風氣風眩頭面風中風濕痺肺弱房少精

八風散方

秦膠獨治伏神暑預山茱萸高本天雄

乳研七

八味切搗篩為散以酒服方寸匕日二服四時散方

依日月散法

又云治人風氣風眩頭面風中風脚弱風濕痺弱房

少精傷寒上痛中惡冷病十善散方一名十方散

秦膠獨法伏神暑預山茱萸高本天雄

鍾乳研七夕藥千薑

十味切搗篩為散以酒服一方寸匕日二服四時散

八兩

千金方治風頭眩口鳴目痛耳聾大三五七散方

天雄三兩細辛三兩山茱萸五兩千薑五兩暑

預七兩防風七兩六味下篩為散漬酒服五升

二日再不知稍加

又云小三五七散主頭風目眩方

天雄三兩山茱萸五兩暑預兩七

三味下篩漬酒服五升二日再不知稍加



天雄三兩 紐三兩 山茱萸五兩 干薑五兩 暑

頤七兩 防風七兩 六兩下篩 散漬酒服五升

二日再不知 稍加

又玄小三五七散 主頤風目眩方

天雄三兩 山茱萸五兩 暑頤兩七

三味下篩 漬酒服五升 二日再不知 稍增以知為度

又玄治頤風方

常以九月九日取菊花作枕袋枕頭

又方玄芥子末酢和付頭一周時覆之

又玄亭歷子煮末不過三四度愈

又方菊花獨活茵草防風細辛蜀椒星美

桂心杜蘅可作沫及慰之 集驗方同之

酥驗方桃花散治風頭眩倒及身體風痺走皮

膚中方

石南五兩 暑頤四兩 當歸三兩 山茱萸三兩

桃花半升 菊花半升 真朱半兩 天雄一兩 炮

凡八物合治下篩食竟酒服半錢止日三稍增之

集驗方治風頭眩欲倒眼旋屋轉頭眩痛防風松實

湯方 防風三兩 枳實三兩 伏神四兩 麻黃四兩 去草

細辛二兩 芎藭三兩 前胡四兩 生薑四兩 半夏

四兩 炙甘草三兩 上物切以水六升



凡八物合治下節食竟涌脹半盛止日三補填之

集驗方治風頭眩欲倒眼旋屋轉頭眩痛防風松實

湯方

防風三兩枳實三兩ハテシカナ 伏神四兩麻黃四兩カクタクナ 去草チフス

細辛二兩アヲシネ 芍藥三兩オシカク 前胡四兩ウシハシカ 生薑四兩ホソク 半夏ホソク

四兩カクモ 杏仁三兩カラモ 竹瀝三升カクモ 土物切以水六升

升ハ 合竹瀝煮取二升七合分三服類眼兩三劑九

良

冒作暗冒作暗 葛氏方治惡風頭每天陰輒發眩冒者方仙ル

莫韓及  
伍目細視  
也

取塩一升以水半升和陰頭如絮巾裏一宿當黃

汗出愈附子屑一合内塩中尤良イユ

又方以挂屑和苦酒塗頂上仙

范汪方治鼻孔偏塞中有膿血此乃是頭風所作

兼由肺疾宜服此散方ヨル

天雄八分オホ 干薑五分イリフ 署預四分アケヒカ 通草六分イタキ 山茱イタキ

莫六分仙 天門冬八分ハシロク 凡六物治下節風散酒服

方寸匕日再稍加至二匕

搖要方療風頭痛眼眩心悶陰雨弥甚方

防風二兩ハテシカナ 當歸一兩ヤブセリ 山茱黄 藥胡二兩ウセリ 署預二兩

鷄子二兩去白打 黃礬去白打

右為散用鷄子黃和散令調酒服方寸匕日三



方寸匕日再稍加至二匕

搖要方療風頭痛眼眩心悶陰雨弥甚方

防風二兩ヤブセリ當歸一兩ムアセリ山茱萸ハアヒカナ二兩去白打黃芩去白打胡二兩去白打暑預雨

鷄子二兩去白打黃芩

右為散用鷄子黃和散令調酒服方寸匕日三

增深方治頭風方

吳茱萸三升ユルイ以水五升煮取三升以綿染汁以拭カラハヒカリ髮根數用

灸頭風方

天官論云

千金方云灸天窓穴在上星後寸

灸後頂穴在百會後寸

百病尉灸云灸百會穴在頂上旋毛中

又云灸前項穴在並會後一寸五分

又灸五處穴在當兩眼入髮際一寸

治中風口噤方第八

病源論云諸陽經筋皆在於頭三陽之筋并結入

於顙頰夫於口諸陽為風寒所客則筋急故口噤

不開也

葛氏方治口噤不開者方

取大豆五升ヒラ煮令黃黑以五升酒漬取汁イシヨ秦強

散口以護之



於願類夫於口諸陽為風寒而客則筋急故口噤  
不開也

葛氏方治口噤不開者方

取大豆五升イリテ熬令黃黑以五升イシヨ酒漬取汁シロ奏強  
數口以護之

又方獨活四兩桂二兩以酒水各二升取合煮一升半  
分二服溫卧

千金方治中風口噤方

术四兩酒三升シテラ煮取一升頻服之  
又方服淡竹瀝一升

撻要方療中風口噤不知人方

豉五升シシキ茱萸一升以水七升煮三沸飲之千金方同之

廣利方理中風口噤不開方

獨活一大兩切以清酒二大升煮取一升半即大  
豆五大合イリテ熬取煎酒イリテ熱投豆中密蓋經下食  
久无過服二大合口噤即ヒカハ柳口灌之イシヨ日三四度  
在後及柳折也

効驗方治人卒中風欲死口不開身不得者此方席大豆

散方

大豆二兩イリテ薑二兩イリテ蜀椒二兩去目汗  
凡三物搗下篩酒服一錢上日一愈

新錄方治口噤方



効驗方治人卒中風欲死口不開身不得者席大豆

散方

大豆二兩イリテ薑二兩モト蜀椒二兩モト

凡三物槵下篩酒服一錢上日一愈

新録方治口禁方

灸萊蕪穴在頤前下脣之下又方灸頤尖七

炷

治中風口喎方第九

病源論云風邪入於足陽明手太陽之經遇寒則

筋急引頰故使口喎言語不正而目不能卒視

養生方云夜卧當耳勿合有孔風入耳口喎言

大素經云頰筋有寒則急引頰移口有熱則筋弛縱

緩不勝故辟

治之以馬膏其急者以自酒和桂以塗其緩

者以來駒之即以生來灰置之坎中高下

与坐等以膏熨急頰且飲美酒散美酒不

飲酒者自強也為之三樹而已音撫摩拊也

録驗方治口眼相引喎僻者方

以生薑炙血塗之以來物勿過拊著耳也血

干復塗之用白酒勝血小品方同之

張要療風口面喎兼暴風半身不隨語不轉方



飲酒者自強也。為之三樹而已。音撫摩拊也。

錄驗方治口眼相引。喝僻者方。

以生薑黃血。塗之以來物。勿過掛。看耳也。血。

干復塗之用。白。酒。勝。血。小品方同之。

樣要。療風口面。喝。兼。暴風。半身不隨。語不轉方。

以酒煮桂心。取汁。濕。故布。搗。病上。則。心。左。喝。搗。

右。喝。搗。左。秘。不。傳。常用。大。効。

僧深方治風者。人面引口。偏。看。牙車。急。舌。不得轉方。

竹瀝一升。獨活三兩。生地黃汁一升。凡三物合煮。

取一升。頓服之。

又方。翳風穴。灸三壯。主耳聾。口眼。為。僻。不。正。

手車引口。禁不開。瘡。不能言。甚。神良。穴。在耳。

後陷者。中。按之。引耳。

小品方云。眼。動。口。唇。動。偏。喝。皆。風。入。脉。故也。

急服小續命湯。摩。神明膏。

又方。灸。吻。邊。橫。文。赤。白。際。逐。左。右。風。乘。不。入。

寒。灸。隨。年。壯。日。三。報。之。三。報。且。息。三。日。不。効。

復三報之。

千金方治中風口喝方。

炒大豆三升。合。焦。酒。三升。淋。取汁。頓服。之。日。一。方。同之。

又方。是。美。大。者。一。枚。去。皮。子。灸。一。方。一。枚。下。篩。三。



寒灸隨年壯日之報之三報且息三日不効復三報之

千金方治中風口噤方

炒大豆三升令焦酒三升淋取汁頓服之日一方同之  
又方是美大者一枚去皮子炙一方一安下鹽  
年苦酒和塗之左噤塗右之右噤塗左

集驗方治中風口噤辟不正方

取空青如來者著口中含咽之即愈  
千金方云如  
五一枚含之

葛氏方治口噤僻者方

衍秦灰口吻中橫文間覺大熱便去艾即愈  
忽勿盡艾之則大過左噤灸右之噤灸左又  
方驚血秘為頭塗之欲心即拭去

秦  
居後切牛鼻環

范汪方治中風口僻紫方

豉五升茱萸一升合煮三沸去滓飲汁神驗又方  
兩干又於頸上隨僻左右灸肘頸三四壯

經心方治口噤方

青松葉一斤搗令出汁清酒一升漬二宿近火一  
宿初服半升漸至一升頭面汗即止同之  
又方

取衣裏麻履邊即止

治中風舌強方第十

病源論云脾脉絡胃夾咽連舌本散舌下心之別脉



青松葉一斤搗令出汁清酒一升漬二宿近火一

宿初服半升漸至一升頭面汗即止千金方同之又方

取衣裏麻屨邊印心

治中風舌強方第十

病源論云脾脉絡胃夾咽連舌本散舌下心之別脉

係舌本令心脾二藏受風邪故舌強不得語也

范汪方治風舌強不語方

豉煮汁漸服一日可數十過不煩多

又方新好桂煎削去皮下節以三指撮著舌下

咽之又方灸廉泉穴在頰下結喉上舌本今葉華他

傳云中經穴主中風舌強不語在頰下骨裏白骨中

集驗方治卒不得語方

煮大豆取汁稍含咽之

又方取桂尺水三升煮取一升頓服之

三物含下節酒服一錢上日一汗出即

葛氏方治中風不語方

豉菜萸各一升水五升煮取二升稍服之

又方灸第二第三椎上百五十壯

錄驗方治舌強不能語言舌下藥樊石散方

樊石二兩桂心二兩

凡二物下節量石下便能言



葛氏方治中風不語方

菰菜萸各一升水五升煮取二升稍服之

又方灸第二第三椎上百五十壯

錄驗方治舌強不能語言舌下藥樊石散方

樊石二兩桂心二兩

凡二物下篩置舌下便能言

治中風失音方第十一

病源論云唯龍者氣之所以上下也唯厭者聲之

門戶也舌者聲之機口者聲之扉也風寒客於

喉厭之間故卒然無音故謂風失音不語

范汪方治失音大豆紫湯方

大豆一升熬令焦好酒二升合煮令沸隨人多

少服取令醉

効驗方治卒風失音大豆散方

大豆熬令焦蜀椒去目汗干薑各二兩

凡三物合下篩酒服一錢上目一汗出即愈

千金方治卒失音方

濃煮桂枝汁服一升覆取汗并不可末桂著舌

下漸引汗

又方濃煮大豆汁含之效尤良

又方灸天窗百會穴新厥方同之



千金方治卒失音方

濃煮桂汁服一升オホシ復取汗オホシ并不可未桂著オホシ古

下漸オホシ汁

又方濃煮大豆汁含之オホシ效尤良

又方灸天窓百會穴

新厥方同之

孟詵食經治失音方

杏仁三分オホシ去皮オホシ煨オホシ作脂オホシ桂心末一分オホシ和如泥取李

核オホシ許綿裹少咽之日五夜オホシ又方搗梨オホシ針一合填

服之オホシ

治中風聲嘶方第十二

病源論云聲嘶者風オホシ冷傷於肺之所為也

葛氏方治卒中オホシ冷聲嘶オホシ啞方

作瘕又作啞音

甘草一兩桂心二兩五味二兩杏仁廿枚生薑八

兩切以水七升煮取二升三服

耆婆方治人聲嘶喉中不利方

桂心杏仁オホシ于薑オホシ芎藭甘草オホシ各一分

石五味搗篩以蜜和為丸如梧子口中含咽

汁

治聲啞不出方第十三

葛氏方治卒失聲オホシ啞不出方

今案病源論惟有五豎而元聲啞風啞假

橘皮五具水三升煮取一升頓服



石五味搗篩以蜜和為丸如梧子口中含咽

汁

治聲不出方第十三

葛氏方治卒失聲ヒツツ不出方ムセ

今案病源論雅有五聲而元聲堂風聲微

橘皮五具水三升煮取一升頓服

又方針大椎旁一寸五分

又方濃煮苦竹葉服之

又方搗蘘荷根酒和絞飲其汁シホリ

樊石柱末綿裹如棗內舌下有唾吐出之ハハキ

耆婆方治人風壹方ムセ

寒羊角五兩カテモウツウ通草二兩半アケハツカラ防風二兩ハアスカナ麻二トリウアミクモ

兩甘草四兩炙

五味搗篩為散以白飲服一方寸匕日二ムセハハハ

治中風驚悸方第十四コホハハハ

病源論云風驚悸者由體虛心氣不足心之經為風耶

所乘也或恐懼憂患迫令心氣虛亦受邪風搏於心ハハキ

則驚不自安驚不已則悸動不定其狀目精不轉ハハキ

而不能呼

拯要方四神鎮心丸他療男子讀誦健忘心神不寧ハハキ

風虛弱補骨髓方

伏神十二分他天門冬十二分他干地黄十二分他人參八分他



則驚不自安驚不已則悸動不安其狀目精不轉而不能平

按要方四神鎮心丸能治療男子讀誦健忘心神不寧心方風虛弱補骨髓方

伏神十二分天門冬十二分干地黄十二分人參八分能治

遠志皮八分已上蜜丸飲服十五丸日每加至卅丸

博濟女界方云治因重病虛損後或目黑慮失心驚

悸心忪或夜間狂言恒常憂怕或如神不足人小兒

諸驚癇等并時疾心熱等並宜服七寶鎮心丸服

七寶鎮心丸

犀角一雙金薄五十犀角五十光明珠二雄黃二

牛黃二犀珀二真珠二龍腦二麝香二

右如法研如麵以棗肉為丸如棗豆大每日空心

心以井花水下三丸或五丸或七丸量而服之

小品方遠志湯治中風心氣不定驚悸言語謬誤

恍惚心中煩悶耳鳴方

遠志三兩去心伏苓二兩獨活四兩甘草二兩

芍藥三兩去心當歸二兩去心桂枝三兩去心麥門冬三兩

半去心生薑五兩人參二兩附子一兩炮

黃耆三兩

凡十二物以水一斗二升煮取四升服八合人羸可



遠志三兩去心 伏苓二兩 獨活四兩 甘草二兩

芍藥三兩去心 當歸二兩 桂枝三兩 麥門冬三兩

半去心 生薑五兩 人參二兩 附子一兩炮

黃耆三兩炙

凡十二物以水一斗二升煮取四升服八合人羸可

服五合日三夜一

葛氏方治人心下虛悸方

麻黃半夏分等禱容丸服如大豆三九日三

千金方云補心湯主心氣不足多汗心煩喜獨語多

夢不自覺オホユ 喉自痛イ 時生血舌本強水漿水不通

方

紫石英二兩 麥門冬三兩 伏苓二兩 人參二兩

紫菀一兩 桂心二兩 赤小豆廿四枚 甘草一兩

干棗廿枚ホシナカメ

九味水八升煮取二升半分三服宜春夏服

又云定志湯主心氣不足心痛驚恐方

遠志四兩 昌蒲四兩 人參四兩 伏苓四兩

四味水一斗煮取三升分三服

僧深方云定志丸治恍惚憶忘胸中恐悸志不定

定風氣干藏方

人參二兩 伏苓二兩 昌蒲二兩 遠志二兩



遠志四兩 昌蒲四兩 人參四兩 伏苓四兩

四味水一斗 煮取三升分三服

僧深方云定志丸治恍惚憶忘中恐悸志不定

定風氣千藏方

人參二兩 伏苓二兩 昌蒲二兩 遠志二兩

防風二兩 獨活二兩

凡六物治下篩以蜜丸如梧子服五丸日再

今案范汪方加職

精一合細辛四分

治中風四支不<sub>レ</sub>屈伸方第十五

病源論云風四支拘攣不得屈伸者曲體虛湊理

開風邪在筋筋故也

小品方云張仲景三黃湯治中風手足拘攣百草

疼煩發作心亂惡寒引日不欲飲食秘方

麻黃五分 去草 獨活五分 細辛一分 黃耆二分

黃芩三分

凡五物以水五升煮取三升分再服一服即小汗出

兩服大汗出即愈

葛氏方云若骨節疼痛不得屈伸<sub>近之則痛短氣</sub>

氣自汗出或欲腫者方

附子二兩 桂心四兩 木三兩 甘草兩 水六升

煮取三升分三服汗出愈



凡五物以水五升煮取二升分再服一服良小治

兩服大汗出即愈

葛氏方云若骨節疼痛不得屈伸<sup>延</sup>之則痛短氣氣自汗出或欲腫者方

附子二兩桂心四兩木三兩甘草兩水六升煮取三升分三服汗出愈

又云若手足不隨者方

取青布燒作炆<sup>炆</sup>於小口器中燠<sup>燠</sup>痛處佳

又方或三升水九升煮取三升分三服

治中風身體不仁方第十六

病源論云風不仁者由營氣虛衝氣實風寒入於肌肉使血氣行不宣流其狀<sup>如</sup>痺衣是也

葛氏方云若身中有制<sup>制</sup>痛不仁不隨處者方

取干艾葉一斛許丸之內凡<sup>凡</sup>翫下塞餘目唯目以痛處著翫目上燒艾以煙之一特間愈

又方好木<sup>好</sup>剉之以水煮令濃<sup>濃</sup>契<sup>契</sup>的<sup>的</sup>之<sup>之</sup>以漬<sup>以</sup>痛處

良

治中風身體如虫行方第十七

病源論云風大虛耶中於營衛溢於皮膚之間與虛熱并故遊<sup>遊</sup>乘<sup>乘</sup>通<sup>通</sup>體<sup>體</sup>狀若虫行

千金方治風身體如虫行方

煮一升水一石剪成半<sup>半</sup>後清溫洗三四遍亦治一切



治中風身體如虫行方第十七

病源論云風大虛耶中於營衛溢於皮膚之間與虛  
熱并故遊乘通體狀若虫行

千金方治風身體如虫行方

塩一升水一石剪臧半他方云澄清温洗三四遍亦治一切

風又方以大豆漬餅將米中旦温洗面頭數不淨加

少麵勿以水濯之

又方成鍊雄黃松脂分等蜜和飲服十九如梧

子曰三慎酒客塩或神祕不傳

治中風隱軀方第十八

病源論云耶氣客於皮膚復逢風相折則起風搔

隱軀

赤癰者由涼濕折於肌中之熱結成赤癰也

得天熱則刺取冷則減也

白癰者由風氣折於肌中熱之與風相搏為白癰也

得天陰雨冷則刺出風中刺得晴温則減者衣

身温之善

素問云赤軀忽起如蚊煩癢重者龍起搔之逐年

細起也有白軀之如此

小品方白癰方

直資角龍易少首又谷圭



得天陰雨冷則剷出風中之刺得晴溫則滅者衣

身溫之矣

素問云赤輪忽起如蚊烟煩癢重沓龍起搔之遂平  
救言及 刺之 烟竹合及 起也 有白輪之如此

小品方白癬方

與羊脂及 瘡也

宜煮蒲薹湯与少酒以浴佳

又方以酒煮石南草拭之

又方水煮樊石汁拭之

又云赤癬方

宜生地銜草澆之最驗大法如治丹諸方

千金方治隱軋百治不羗方

景天一斤一名慎火搗絞取汁澆上熱灰手摸之

再三度即羗

又方樊石二兩末酒三升漬令滓拭上立羗

又方澤菜煮湯洗之

又方芒消八兩水一斗煮取四升濕綿拭

又淋石灰汁洗

又方大豆三升酒六升煮四五沸服一盃日三

如意方治隱軋術

漏蘆作湯以洗浴

効驗方治風瘙菜萆湯方



又淋石灰汁洗

又方大豆三升酒六升煮四五沸服一盃日三

如意方治隱軫術

漏蘆シロクサ作湯以洗浴セツ

効驗方治風瘙茱萸湯方

茱萸一升酒清五升凡二物合煮得一升

五合絞去滓シホ適寒溫洗日三カス

錄驗方黃連湯治風瘙隱軫方

芒消五兩黃連五兩凡二物以水八升煮

取四升去滓洗風痒カクテクセ家日二良カセホコシ

本草替豉風瘙隱軫方

煮ニタ豉沙汁漬之カヒコラフ又方カキミ梓葉單煮洗之ヒタセ

又方ムハミギノ芡菜可作浴湯

孟洗食經風瘙隱軫方

煮赤小豆取汁俾冷洗之

治中風隱軫瘡方第十九カセホコシ

病源論云人皮膚虛為風寒所折則起隱軫寒多

則色赤風多則色白甚者瘡痛瘙之則成瘡痒カユリ

葛氏方卒得風瘙隱軫瘙之生瘡汁出初痒後痛カユク

煩悶不可堪方

燒石令赤以少水中內塩數合及熱酌以洗漬之ヒタセ



病源論云人皮膚虛為風寒所折則起隱疹寒多則色赤風多則色白甚者瘡痛搔之則成瘡

葛氏方卒得風搔隱疹搔之生瘡汁出初痒後痛

頭悶不可堪方

燒石令赤以少水中內塩數合及熱酌以洗漬之

又方劉棄皮二斗許煮令濃及熱以自洗浴

又方以塩湯洗之按藥米灌之

又方以煖火令致搗以傅之

醫門方玄煮薤蕖湯和少酒以浴之極佳

劉涓子方治耳體隱疹瘡方

地榆根三兩 黃連二兩 大黃四兩 黃芩四兩

苦參八兩 甘草六兩 芍藥四兩

石七物以水六升煮取三升半浴洗

孟洗食經云打莖單煮洗浴之

又方薤蕖可作浴湯

又方煮赤小豆取汁停冷洗不過三四

又方楊葉葉對上

治中風癩病方第廿

病源論云凡癩病皆是惡風及犯觸忌客得之初覺

皮膚不仁或淫之若瘡如虫行或眼前見物如虫絲

或隱癩赤黑治之新米穀看麤專食胡麻松木



又方楊葉葉對上

治中風癰病方第廿

病源論云凡癰病皆是由風及犯觸忌客得之初覺

皮膚不仁或注之若瘡如虫行或眼前見物如虫絲

或隱癰赤黑治之新米穀看鮭專食胡麻松木

氣善然癰名不一木癰火癰金癰土癰水癰諸癰

而癰疥癰均酒癰也又有烏癰白癰論諸癰形狀在

本書依錄不載

又云酒醉露卧不幸生癰

錄驗方云有人五癰八風之法一木癰二石癰三風癰

四水癰五沸癰

草葛代方云癰病乃有八種云

治白癰烏癰方

苦參根皮乾之麻搗以好酒三斗漬廿一日去滓

服三合日三

又方干艾葉隨多少濃煮以漬麵及飯釀如常

法酒就火隨意飲恒使薰

又方取馬薪蒿一名馬矢蒿一名爛石草搗末

末服方寸匕日三百日更赤起一年都差復色

又方搗好雌雄未苦酒和雞羽染以塗瘡上乾

復塗之



法酒就隨意飲恒使薰ハニユクハ

又方取馬薪蒿一名馬矢蒿一名燔石草搗末ハニユクハ

末服方寸匕日三百日更赤起一年都差復色ハニユクハ

又方搗好雌苗末ハニユクハ苦酒和雞羽ハニユクハ染以塗瘡上乾ハニユクハ

復塗之ハニユクハ

僧深方治癩方

水中荷濃煮以自漬半日用此方多愈ハニユクハ

又方水中浮青萍ハニユクハ濃煮自漬之ハニユクハ

范汪方治大風癩瘡方

取葎草一擔ハニユクハ二石水煮取石汁以漬劇不過ハニユクハ

三漬愈ハニユクハ

集要方治癩方

田黃苦酒和塗之ハニユクハ

治中風言語錯亂方第廿一ハニユクハ

病源論云風邪者謂風氣傷於人也以身肉面氣為ハニユクハ

正外風氣為邪若其居處失宜飲食不節致府ハニユクハ

藏內損血氣外虛則為風邪所傷故病有五邪ハニユクハ

一曰中風二曰傷暑三曰飲食勞倦四曰中寒五曰ハニユクハ

中濕其為病不同中邪者發時則不自覺知狂ハニユクハ

或妄言悲喜無度是也ハニユクハ

僧深方五邪湯治風邪入人體中鬼語妄有所說悶ハニユクハ



藏內損血氣外虛則為風邪所傷故病有五邪  
一日中風二日傷暑三日飲食勞倦四日中寒五日  
中濕其為病不同中邪者發時則不自覺知狂  
或妄言悲喜無度是也

僧深方五邪湯治風邪入人體中鬼語妄有所說悶  
亂恍惚不足意志不定發來注有時方

人參三兩 伏苓三兩 伏神三兩 白朮三兩 昌蒲三兩  
凡五物水一斗煮取二升半去滓先食服八合日

三

范汪方伏神湯五邪氣入人體中鬼語妄言有所見  
聞說心悸慙恍惚不定發作有時方

伏神三兩 昌蒲三兩 赤小豆廿枚 人參三兩 伏苓三兩  
凡五物水一斗煮取二升半分三服

經心方慈利湯治邪發無常罵詈與鬼語方

烏頭一分 恒山一分 甘草一分 慈利一分

桃花一分

五味好酒四升煎取一升頓服大吐

治中風癱病方第廿二

病源論云五癱者一陽癱二陰癱三風癱四濕癱

五馬癱也人有血氣少則心虛精神離散魂魄妄行

目為風邪所傷邪入陰則為癱疾又人在胎時其母



杜花  
五味好酒四升ヨキ煎取一升二分頓服大吐

治中風癱病方第廿二

病原論云五癱者一陽癱二陰癱三風癱四濕癱  
五馬癱也人有血氣少則心虛精神離散魂魄妄行  
目為風邪所傷邪入陰則為癱疾又人在胎時其母  
卒大驚精氣并居令子發癱其發則作地吐涎沫  
無所覺是也セトル

千金方云治癱疾者視之有過者即畫之量其血  
於瓠葉之中至其發時血獨動矣ヒモコヨホ

范汪方治五癱方

鐵精一合 芎藭一兩 地床子五合 防風一兩ヒルム口

凡四物合和搗下篩日三服日用一錢有驗昂愈ハテカナ

又方灸足澤穴在時中動脈セヨ

効驗方高風散治癱勞方

蜀天雄一分 炮山茱萸一分 署預十四分 獨活八兩

一方八分 石南草十二分一方 人參十分 蜀附子二分一方

木一分 桂心十二分 干薑八分一方 烏頭六分炮

細辛一分

凡十二物酒下篩酒服方寸匕日三不知稍增以セヨ

知為度イセ

小品方治癱疾發作僵仆不知人言語妄見鬼方オコチ



木一分 桂心十二分 干薑八分 一方為頭六分

細辛一分

凡十二物酒下篩服方寸匕日三不知稍增以

知為度

小品方治癰疾發作僵仆不知人言語妄見鬼方

狼瘡子三升漬酒五升漬出膠乾後內針盡膠子

搗治末蜜腹服四分日三

葛氏方云癰病方

灸陰莖上宛中三壯得少便通便愈

又方灸足大指聚毛中七壯

又新鷄冠血漚口中

千金方云風癰灸天窓百會各三百壯

狂癰坐言黃胃管百壯狂走癰疾灸大幽百壯

狂走癰癰灸季肋廿壯狂言妄語灸間使廿壯

狂走書怒悲泣灸巨攬隨年壯

治中風狂病方第廿三

病原論云狂病者由風邪入并於陽所為也風邪

入人血脉使人陰陽二氣虛實不調若一實一虛

則全血氣相并氣并於陽則為狂發則欲走或自

高賢稱神聖是也

千金方云狂發少卧不飢自高賢自辨知自貴大



病原論云狂病者由風邪入并於陽所為也風邪  
入人血脉使人陰陽二氣虛實不調若一實一虛  
則全血氣相并氣并於陽則為狂發則欲走或自  
高賢稱神聖是也

千金方云狂發少卧不飢自高賢目辨知自貴大  
善罵詈日夜不休

小品方治卒發狂方

用其人著地以冷水淋其面終日淋之

又云卒狂言鬼語方

以亂帶急合縛兩手又指便灸左右脇下對屈

肘頭兩火俱起灸七壯須臾鬼語自云姓名及名

乞得去徐々詰問乃辭其手也

又云狂罵詈隨打人方

灸口兩旁過顴九處赤白際各一壯并灸

背胛間名臣攬三日一報之

又方灸陰囊下縫廿壯女人者灸陰會也

葛氏方治卒發狂方

燒蝦蟇搗末服方寸匕日三

又方煮大三年陳補去滓服之

又云狂言鬼語方

針其足大母指爪中下八小許即止

治虛熱方第廿四



葛氏方治卒發狂方

燒蠟カハル搗末服方寸匕日三

又方煮三年陳補去滓服之フリカカサカハル

又云狂言鬼語方

針其足大母指爪甲下入小許セツコトナヒヤム又即止

治虛熱方第廿四

病源論云虛勞而生熱者是陰氣不足陽氣有餘故內外生於熱非邪從外來乘之也

搔要方療一切虛熱氣擁滯結不通三黃丸方

黃連二兩 大黃二兩 黃芩三兩

上件三物搗蜜和丸如梧子食後服三丸日三

又云療心膈間虛熱氣上迫咽喉口乾方

茯苓五兩 麥門冬三升二合去心 烏梅肉二兩

石蜜丸如酸棗大含銷之日夜含六七枚

若因食昂口苦者升麻三兩

廣濟方療虛熱臨送不下食昂煩乾地黃飲方

生地黃汁六合 蘆根一握生麥門冬一升

人參八分 橘皮六分生薑八分 白蜜三合

切以水六升煮取二升去滓下地黃汁蜜分

溫服三如人行四五里進一服不病慎生寒熱

麵炙肉カクチアツク高ソコムキ麥ホトコシ猪ブタ蒜ニンニク粘食

經心方大黃丸治虛熱食飲不消化頭眩引背ヒキ脅ヒキ攣

粘女廉反  
与粘同  
相著也



人參八分 橘皮六分 生薑八分 白蜜三合

切以水六升煮取二升去滓下地黃汁蜜分

溫三如人行四五里進一服不痢慎生菜熱

麵炙肉高麥猪蒜粘食

粘女廉反  
与粘同  
相著也

經心方大黃丸治虛熱食飲不消化頭眩引背脅痠

中介口中爛傷不著食方

物塞喉中也

大黃一兩 黃芩一兩 黃連三兩 苦參二兩

オホシ

ヒナキ

クラフ

龍膽二兩

エヤアキ

五味蜜丸如梧子服五九日三

又玄生地黃煎火治虛熱及血利方

生地黃汁三升石內汁罏器中投微火上

煎令如飴服二合

効驗方龍膽丸治朝寒暮熱手足煩鼻張面青

不能飲食方

龍膽二升 黃連二升 黃芩二升 人參二升

芒硝二兩 大黃二升

凡六物治下痢蜜丸如梧子服五九日三不知

可至七丸

葛氏方云若針中熱結煩滿悶亂狂言起走者

方

以芫花一升水三升煮取升半以布漬湯中掬

青丸

唐藥

カハコ

切中上糸復易



凡六物治下篩蜜丸如梧子服五丸日三不知可至七丸

葛氏方云若針中契結煩滿悶亂狂言起走者方

以芫花音元一升水三升煮取升半以布漬湯中掬音才勺中上煅復易音九

治客熱方第廿五

病源論云客熱者由人府藏不調生於虛熱

客於上則胃羸生淡實口苦舌干客於中

則煩心悶滿不能下食客於下則大便

難小便急澀

脊婆方治人客熱方

生地黄根一握音キコウ淨洗搗音ギ絞取汁內少許蜜少服之音セウ又方以竹瀝待音ヒヤ冷少飲之

又云治季夏月客熱方

升麻兩 甘草一分音カク 藍二分 人參一分

粟米一升一方一合

以水五升煮取半升去滓夜露之平旦一服

之

又云治人舌澀不能食方

薤白十二分 人參二分 防己二分 切搗篩為散

以歐服一方寸匕日二服此方至夏月恒須早服之



藥方一合

以水五升者大取半升去滓夜露之平旦一服

之

又云治人舌涎不能食方

薤白十二分 人參二分 防己二分 切搗篩為散

以歐脹一方寸匕日二服此方至夏月恒須早服之

無此病之

錄驗方竹茹湯治口中寒熱口生瘡爛不得食方

生竹茹四兩 生薑四兩 甘草二兩 前胡兩

伏苓二兩 橘皮一兩

凡六物水六升煮取二升分服半日盡

范任方陽達湯治胸中有契端達肩息方

半夏半升 人參一兩 石膏如鷄子者一枚

生薑四兩 飴四兩

凡五物以水一斗五升煮得七升服一升日三

夜二

醫心方卷第三